



Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza / koncentracija	Karenca (dani)
Mirovanje vegetacije	prezimljavajuće forme patogena	<u>Bakarni oksihlorid-50</u>	0,5-0,75%	OVP
Bubrenje pupoljaka	kovrdžavost lista breskve	<u>Dakoflo 720 SC</u> ili	0,25-0,35%	OVP
		<u>Diziram 76 WG</u> ili	0,3%	21
		<u>Galileo*</u>	0,075-0,1%	OVP
Pred otvaranje pupoljka (pred pojavu zelene tačke)	kovrdžavost lista breskve	<u>Dakoflo 720 SC</u> ili	0,25-0,35%	OVP
		<u>Diziram 76 WG</u> ili	0,3%	21
		<u>Galileo*</u>	0,075-0,1%	OVP
Cvetanje	monilija	<u>Dional 500 SC</u> 	0,15%	7
Precvetavanje	šupljikavost lista	<u>Metod 480 SC</u> +	0,2-0,3%	21
	monilija, pepelnica	<u>Akord</u> +	0,075%	7
	lisne vaši, trips	<u>Tonus</u> +	0,04%	28
	lisne vaši	<u>Polux*</u>	0,03-0,05%	14
Plod veličine oraha	šupljikavost lista	<u>Metod 480 SC</u> +	0,25%	21
	monilija, pepelnica	<u>Akord</u> +	0,075%	7
	breskvin smotavac	<u>Harpun</u> +	0,1%	28
	lisne vaši, trips	<u>Tonus</u>	0,05%	28
Nakon proređivanja	šupljikavost lista	<u>Mankogal 80*</u> +	0,25%	21
	monilija, pepelnica	<u>Akord</u> +	0,075%	7
	breskvin smotavac	<u>Dimetogal</u> 	0,15-0,2%	21
15-20 dana nakon proređivanja	šupljikavost lista	<u>Diziram 76 WG</u> +	0,3%	21
	monilija ploda	<u>Dional 500 SC</u> +	0,15%	7
	štetni insekti	<u>Fobos EC</u>	0,05%	28
7 dana pred berbu	monilija ploda	<u>Dional 500 SC</u>	0,15%	7
	breskvin smotavac	<u>Polux*</u>	0,05%	14

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza / koncentracija	Karenca (dani)
Jesenje plavo tretiranje	kovrdžavost lista breskve, šupljikavost lista	<u>Bakarni oksihlorid-50</u>	0,75%	OVP



Epin ekstra i



Cirkon su biostimulatori

Suzbijanje korova:

- **Glifol** - Kada su korovi visine 10-40 cm (za zasade starije od 4 godine)
 - 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova -> 35
 - 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova -> 35
- **Bonaca EC** -> 1,5-2 l/ha (širokolisni korovi u fazi intenzivnog porasta) -> OVP

Sprečiti nanošenje herbicida na gajene biljke!