

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza / koncentracija	Karenca (dani)
Mirovanje vegetacije	kruškina buva	<u>Galmin</u>	3%	OVP
		+ <u>Cipkord 20 EC</u>	0,03%	28
Bubrenje pupoljaka	bakteriozna plamenjača, čađava pegavost lista	<u>Bakarni oksihlorid-50</u>	0,5-0,7%	OVP
Mišje uši	čađava pegavost lista i krastavost plodova	<u>Metod 480 SC</u>	0,3%	21
		+ <u>Konzul</u>	0,15%	28
	kruškina buva	+ <u>NU Film 17</u>	0,1%	-
Beli baloni	čađava pegavost lista i krastavost plodova	<u>Mankogal 80</u>	0,25%	21
		+ <u>Fobos EC</u>	0,05%	28
	kruškina buva, eriofidne grinje	+ <u>Galmin</u>	0,5%	21
Cvetanje	čađava pegavost lista i krastavost plodova	<u>Pehar*</u>	0,1%	28
		+ <u>Mankogal 80</u>	0,25%	21
Precvetavanje	čađava pegavost lista i krastavost plodova	<u>Pehar*</u>	0,1%	28
		+ <u>Metod 480 SC</u>	0,3%	21
	kruškina buva	+ <u>Kulisa*</u>	0,035%	14
	eriofidne grinje	+ <u>Fobos EC</u>	0,05%	28
Prvo posle precvetavanja	čađava pegavost lista i krastavost plodova	<u>Mankogal 80</u>	0,25%	21
		+ <u>Sekvenca*</u>	0,02%	28
	kruškina buva, eriofidne grinje	+ <u>Tonus</u>	0,05%	28
		+ <u>Abastate</u>	0,15%	14
		+ <u>NU Film 17</u>	0,1%	-
Drugo posle precvetavanja	čađava pegavost lista i krastavost plodova	<u>Metod 480 SC</u>	0,3%	21
		+ <u>Sekvenca*</u>	0,02%	28
	kruškina buva, jabukin	+ 		

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza / koncentracija	Karenca (dani)
	smotavac	<b><u>Tonus</u></b>	0,05%	28
		+ <b><u>Konzul</u></b>	0,1%	28
		+ <b><u>NU Film 17</u></b>	0,1%	-
Treće posle precvetavanja	čađava pegavost lista	<b><u>Mankogal 80</u></b>	0,25%	21
		+ <b><u>Harpun</u></b>	0,15%	28
	kruškina buva	+ <b><u>Abastate</u></b>	0,15%	14
		+ <b><u>Galmin</u></b>	0,3%	21
Četvrto posle precvetavanja	čađava pegavost lista	<b><u>Metod 480 SC</u></b>	0,3%	21
	skladišne bolesti	+ <b><u>Galofungin T*</u></b>	0,1%	14
	jabukin smotavac	+ <b><u>Fobos EC</u></b>	0,05%	28
	kruškina buva	+ <b><u>NU Film 17</u></b>	0,1%	-
Peto posle precvetavanja	skladišne bolesti	<b><u>Galofungin T*</u></b>	0,1%	14
		+ <b><u>Abastate</u></b>	0,15%	14
	kruškina buva	+ <b><u>Kulisa*</u></b>	0,035%	14
		+ <b><u>NU Film 17</u></b>	0,1%	-
15 dana pred berbu	skladišne bolesti	<b><u>Galofungin T*</u></b>	0,1%	14
	jabukin smotavac, kruškina buva	+ <b><u>Polux*</u></b>	0,05%	7
Jesenje plavo tretiranje	bakteriozna plamenjača, palež cvetova, nekroza grana i debla, čađava krastavost	<b><u>Bakarni oksihlorid-50</u></b>	0,5-0,75%	OVP
	kruškina buva	+ <b><u>Konzul</u></b>	0,15%	OVP



Epin ekstra i



Cirkon su biostimulatori

**Suzbijanje korova:**

- **Glifol** - Kada su korovi visine 10-40 cm (za zasade starije od 4 godine)
  - 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova -> 35
  - 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova -> 35
- **Bonaca EC** -> 1,5-2 l/ha (širokolisni korovi u fazi intenzivnog porasta) -> OVP

Sprečiti nanošenje herbicida na gajene biljke!