




Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza / koncentracija	Karenca (dani)
Pred kretanje vegetacije - bubrenje pupoljaka	prezimljavajuće forme biljnih bolesti i štetočina	<u>Bakarni oksihlorid-50</u>	0,5-0,75%	OVP
		+ <u>Galmin</u>	3%	OVP
		ili <u>Plavo ulje</u>	3%	OVP
Početak cvetanja (otvoreno do 20% cvetova)	monilija	<u>Kubik plus</u>	0,25%	OVP
Puno cvetanje (otvoreno 100% cvetova)	monilija	<u>Kubik plus</u> 	0,25%	OVP
Precvetavanje	monilija	<u>Akord</u> +	0,075%	21
	plamenjača, šupljikavost lišća	<u>Mankogal 80</u> +	0,25%	21
	lisne vaši, šljivina osa	<u>Dimetogal</u> 	0,075-0,1%	21
Formiran plod	šupljikavost lišća, lisna rđa, plamenjača monilija	<u>Metod 480 SC</u> +	0,2-0,3%	21
		<u>Akord</u> +	0,075%	21
	lisne vaši	<u>Radar 300 EW</u> +	0,15-0,25%	28
		<u>Polux*</u>	0,03-0,05%	14
Plodovi menjaju boju	šupljikavost lišća monilija	<u>Metod 480 SC</u> +	0,3%	21
		<u>Dional 500 SC*</u> +	0,15%	14
	šljivina osa, lisne vaši	<u>Fobos EC</u> 	0,05%	28
14 dana pred berbu	monilija	<u>Dional 500 SC*</u> +	0,15%	14
	štetni insekti	<u>Polux*</u>	0,03-0,05%	14
Jesenje prskanje	šupljikavost lišća, monilija, plamenjača	<u>Bakarni oksihlorid-50</u>	0,5-0,75%	OVP



Epin ekstra i



Cirkon su biostimulatori

Suzbijanje korova:

- **Glifol** - Kada su korovi visine 10-40 cm (za zasade starije od 4 godine)

- 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova -> 35
- 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova -> 35
- **Bonaca EC** -> 1,5-2 l/ha (širokolisni korovi u fazi intenzivnog porasta) -> OVP

Sprečiti nanošenje herbicida na gajene biljke!